

DIAGNOSES PRÉLIMINAIRES DE LYCIDES AFRICAINS,

PAR M. M. PIC.

Les insectes faisant l'objet de cet article comprennent les récoltes faites, dans leur voyage en Afrique orientale, par les grands voyageurs C. Alluaud et R. Jeannel. Les diagnoses publiées ici sont destinées à prendre date, en attendant que soient publiées les descriptions complètes qui seront comprises dans le manuscrit particulier, rédigé par moi, et comprenant la famille des Lycides, dans les Coléoptères Malacodermes.

Les types uniques sont déposés au Muséum de Paris; je possède également les présentes nouveautés, à l'exception de : *Lycus rufiventris*, *Jeanneli*, v. *moloensis*, *Cladophorus particularithorax*, *Adoceta Jeanneli*.

LYCUS (ACANTHOLYCUS) MODESTUS v. nov. *reducteapicalis*.

Elytris ochraceis, ad suturam plus minusve nigro lineatis et apice reducte nigro notatis.

Kijabe.

Lycus (Lycus) *rufiventris* nov. sp.

Rufus, supra aurantiacus, capite rufo-brunnescente tincto, membris pro majora parte elytrisque apice nigris, thorace postice brevis brunneo notato.

Long. : 16-17 millimètres.

Une paire du Kénya.

Voisin de *L. latissimus* Guer., chez ♂ en diffère par le prothorax plus transversal, largement roux, par sa bande apicale noire ondulée en avant.

LYCUS (LYCUS) FLAMMEATUS v. nov. *moloensis*.

Elytris luteis, nigro marginatis et ad scutellum nigro maculatis.

Un exemplaire de Molo.

LYCUS (LYCUS) FLAMMEATUS v. nov. *discoluteus*.

Elytris nigris, in disco plus minusve et diverse luteo notatis, externe plus minusve nigro marginatis.

Afrique Orientale anglaise, diverses localités.

Lycus (Lopholycus) Jeanneli nov. sp.

♂. *Oblongus, postice valde subrotundato-dilatatus, niger, thorace lateraliter elytrisque luteis, his ad basin medio nigro notatis et apice nigro marginatis, abdomine lateraliter rufo notato.*

Long. : 13 millimètres.

Longonot.

Espèce très distincte par sa forme, jointe à sa coloration apicale noire réduite à une bordure étroite.

LYCUS (HAPLOLYCUS) IMBELLIS v. nov. breveapicalis.

Parum elongatus, subparallelus, elytris luteis, ad suturam antice et apice breve nigro notatis.

Kijabé.

GLADOPHORUS COARCTICOLLIS v. nov. 5-areolatus.

Prothorace lateraliter mediocre coarctato et quinque areolato.

Tanga; Zanzibar.

Gladophorus particularithorax nov. sp.

Elongatus, subparallelus, niger, capite antice rufo, thorace aurantiaco, postice nigro bimaculato, particulare, lateraliter fere recto, antice medio attenuato, areolis antice et lateraliter oblitteratis; elytris aurantiacis, apice sat late nigris.

Long. : 10 millimètres.

Kilimandjaro.

Espèce caractérisée par la particulière structure de son prothorax, qui ne présente qu'une auréole distincte, la médiane postérieure, celle-ci étroite et peu enfoncée. Se rapproche de *incarinatus* Pic.

Cautires Caroli nov. sp.

Elongatus, subparallelus, niger, elytris aurantiacis; antennis ♂ sat longe flabellatis; thorace satis lato, antice medio attenuato, angulis posticis prominulis, 7 areolato; intervallis elytrorum irregulariter punctatis aut plicatis.

Long. ; 7-8 millimètres.

Kénya.

Par sa sculpture élytrale voisin de *C. inapicalis* Pic.

Planeteros atricornis nov. sp.

Elongatus, subparallelus, niger, elytris ochraceis, longissimis; antennis parum gracilibus, articulo 3° lato, sequentibus depressis, elongatis, ultimis angustatis; thorace antice arcuato et rugoso, postice paulo impresso.

Long. ; 8-9 millimètres.

Monts Aberdare.

Voisin de *P. africanus* Brg., en diffère au moins par les angles postérieurs du prothorax très longs.

Adoceta Jeanneli nov. sp.

Angustata, parallela, nitida, fere glabra, nigra, thorace lateraliter postice elytrisque aurantiacis; thorace subquadrato, antice paulo dilatato.

Long. : 7 millimètres.

Kijabe.

Voisin de *A. hirsutula* Brg. mais élytres sans poils dressés et concolor.

Adoceta Alluaudi nov. sp. ⁽¹⁾.

Angustata, subparallela, nigra, thorace lateraliter sat late elytrisque aurantiacis.

Long. : 11 millimètres.

Kijabe.

Voisin du précédent, en diffère par les élytres moins brillants, ornés de quelques côtes distinctes, le prothorax moins étroit, non élargi en avant.

Adoceta suturalis nov. sp.

Augustata, subparallela, nigra, thorace lateraliter elytrisque aurantiacis, his antice longe ad suturam nigro vittatis; thorace sat transverso.

Long. : 11 à 12 millimètres.

Kijabe.

Diffère du précédent par le prothorax plus large, plus aplani sur les côtés et la particulière coloration des élytres.

⁽¹⁾ Cette espèce, ainsi que les suivantes, ont la tête chez ♂ munie d'un commencement de rostre qui apparaît court et plus ou moins large, tandis que le rostre chez *Lygisterus* Muls. est long et très distinct.

Adoceta atricollis nov. sp.

Angustata, subparallela, nigra, elytris aurantiacis; thorace subquadrato aut subtransverso, angulis posticis valde prominulis.

Long. : 13-14 millimètres.

Kijabe.

Espèce très distincte par la structure de son prothorax avec les angles postérieurs grands et relevés.